

Muestra con número de registro 2235

La muestra con número de registro 2235 fue recogida de forma manual durante la campaña de 2008 en la **UE039**, unidad de registro C2 (Fig. 1). Esta unidad estratigráfica se corresponde con el relleno de una estructura negativa similar a un agujero de poste. La madera carbonizada se encontraba hincada verticalmente en el suelo. Teniendo en cuenta, la monoespecificidad de la muestra, sus atributos dendrológicos y su contexto de procedencia. Estos carbones probablemente se corresponden con los restos de un horcón de mangle (*Rhizophora* sp.) preservado por carbonización.




Fig. 1. Plano de la Operación 1 con la distribución espacial de las unidades estratigráficas y la identificación taxonómica de las muestras.

Se han identificado 20 fragmentos de carbón, todos ellos correspondientes con un único taxón: *Rhizophora sp.* Las especies leñosas de la familia de las Rhizophorae tienen como características anatómicas comunes la presencia de perforaciones y puntuaciones escaleriformes. *Rhizophora spp.* incluye a las especies *Rhizophora harrisonii*, *Rhizophora mangle* y *Rhizophora racemosa* que comparten los mismos caracteres anatómicos.

Plano transversal. Anillos de crecimiento indistinto. La madera tiene una porosidad difusa en el anillo presenta vasos aislados o en cortas filas radiales de 2-3 (-4) algunos arracimados con abundantes tílides (Insidewood. 2004-onwards; León, 2001; Richter & Dallwitz, 2000-onwards).

Plano Longitudinal Tangencial. Radios heterocelulares y homocelulares de células procumbentes con 1-5 (-7) células de anchura (Fig. 2); los radios heterocelulares tienen células cuadradas o erectas restringidas a las filas marginales; presenta puntuaciones intervasculares escaleriformes (Insidewood. 2004-onwards; León, 2001; Richter & Dallwitz, 2000-onwards).

Plano Longitudinal Radial. Las perforaciones son escaleriformes de 3-9 (-17) barras, y tiene puntuaciones simples en las intersecciones vasos-radio (Insidewood. 2004-onwards; León, 2001; Richter & Dallwitz, 2000-onwards).

En cuanto a los aspectos dendrológicos observados. En 20 casos los fragmentos presentaban una curvatura débil en el anillo (Tabla 1). Este tipo de curvatura indicaría que probablemente los carbones analizados se corresponderían con troncos o grandes ramas.

	Débil	Moderada	Fuerte	Sin datos
<i>Rhizophora mangle</i>	20			

Tabla 1. Datos dendrológicos: curvatura del anillo.

Todos los fragmentos analizados presentan tílides en el interior de los vasos (Tabla 2). La presencia de este tipo de estructuras ocluyendo los vasos indicaría que son fragmentos de carbón que se corresponderían con el duramen del tronco.

	Tilosis
<i>Rhizophora mangle</i>	20

Tabla 2. Datos dendrológicos: presencia de tilosis.

En lo que respecta a las alteraciones provocadas durante la combustión, se han identificado vitrificación en los tejidos y grietas radiales (Tabla 3). La vitrificación es bastante acusada, llegando en algunos fragmentos a la fusión completa del tejido, y afecta a todos los fragmentos estudiados.

	Vitrificación	Grietas radiales
<i>Rhizophora mangle</i>	15	1

Tabla 3. Datos tafonómicos: alteraciones relacionadas con la combustión.

Las especies comprendidas dentro del género *Rhizophora sp.* (*Rhizophora harrisonii*, *R. mangle* y *R. racemosa*) son especies propias del manglar. Estas formaciones boscosas de plantas leñosas tolerantes a la sal, crecen a lo largo de litorales protegidos de las mareas, y están

dominados por especies arbóreas que han desarrollado adaptaciones fisiológicas, reproductivas y estructurales que les permiten ocupar sustratos inestables y áreas anegadas, sujetas a los cambios mareales en las áreas tropicales y subtropicales (León, 2001: 191).

Rhizophora mangle crece en las áreas costeras de Panamá, especialmente en las áreas fangosas situadas en la desembocadura de los ríos, bahías y esteros (Condit et al. 2011) (Fig. 2). En estas formaciones boscosas aparece acompañada de especies como *Avicennia germinans*, *Conocarpus erectus*, *Laguncularia racemosa* y *Pelliciera rhizophorae*, en las áreas de arena se documentan especies como *Coccoloba uvifera*, y en las áreas de bosque abierto especies de *Prosopis* y *Caesalpinia* (Flores et al. 2010).

Los manglares del Río Grande son actualmente el área más próxima a El Caño en la que se conserva este tipo de formaciones boscosas, comprende los manglares del estuario del Río Grande y Chico (Flores et al. 2010).




Fig. 2. Localización actual de *Rhizophora mangle* en Panamá (Pérez & Condit).

La madera de mangle pesada, dura a muy dura, con una densidad de 0.8–1 g/cm³; de color rosado a castaño claro, sin distinción entre albura y duramen (León 2001; Richter & Dallwitz, 2000-onwards). Con respecto a los usos del mangle y su madera actualmente se refiere su uso como postes de cerca y para elaborar carbón de leña; su corteza es utilizada para obtener taninos para curtir y teñir pieles (Condit et al. 2011). En los textos históricos se describe este árbol y sus usos en el pasado, en concreto Gonzalo Fernández de Oviedo incluye la siguiente referencia: “Mangle es un árbol de los mejores que en estas partes hay [...] é para varaçones de buhíos e estantes ó postes para las casas [...] es de las mejores maderas que hay acá” (Oviedo, IX, VI: 338).

Bibliografía

Condit, R.; Pérez, R.; Daguerre, N. 2011. Trees of Panama and Costa Rica. Princeton Field Guides, New Jersey.

Flores, D.G.; Núñez, E.; Gallardo, M. 2010. Inventario de los humedales continentales y costeros de Panamá. Centro Regional Ramsar para la Capacitación e Investigación sobre Humedales para el Hemisferio Occidental, Panamá.

Insidewood. 2004-onwards <http://insidewood.lib.ncsu.edu/search> [consultado: diciembre de 2016].

León, W. J. 2001. Anatomía del leño, aspectos ecológicos y filogenia en mangles de Venezuela. Revista Forestal Venezolana, 45 (2): 191-203.

Perez, R.; Condit R. Tree Atlas of Panama. URL <http://ctfs.si.edu/webatlas/maintreeatlas.php> [consultado: diciembre de 2016]

Richter, H.G.; Dallwitz, M.J. 2000-onwards. Commercial timbers: descriptions, illustrations, identification, and information retrieval. In English, French, German, Portuguese, and Spanish. Version: 25th June 2009. <http://delta-intkey.com> [consultado: diciembre de 2016]